


Kratki proceduralni priručnik za med.sestre IZVAN JIT


Šta uraditi kad se oglasi alarm za krvni pritisak

KADA OBAVLJATI?

1. Kada se oglasi alarm za krvni pritisak
2. Prilikom promene položaja pacijenta

KAKO OBAVLJATI?

- | | |
|--|--|
| a) Pogledajte monitor da biste proverili zašto se oglasio alarm
b) Prikazuje li monitor normalnu arterijsku krivulju
c) Proverite neinvazivni monitor krvnog pritiska (NIBP) |  |
|--|--|

- | | |
|---|---|
| a) Je li položaj transdjudsera u nivou sa pacijentovim srcem
b) Proverite je li manžetna /NIBP/ sa manometrom naduvana na 300 mmHg |  |
|---|---|

- | | |
|--|--|
| a) Proverite položaj ekstremiteta/ruke/ pacijenta. u koji je uveden arterijski kateter.
b) Proverite ima li na mestu uvođenja znakova upale,pomeranja, savijanja.
c) Menja li se krivulja krvnog pritiska kada se ekstremitet pomakne. |  |
|--|--|

KLJUČNI SIGURNOSNI PROBLEMI / KADA POZVATI POMOĆ

- | |
|--|
| 1. Ako je srednji arterijski krvni pritisak (MAP) <65mmHg: pozovite pomoć |
| 2. Poremećaj svesti: pozovite pomoć |
| 3. Nikada ne isključujte alarne |
| 4. Uvek proverite jesu li trokrake slavinice zatvorene nakon uzimanja krvi |